

## BioNTech/Pfizer

Sehr geehrte zu impfende Person,


Glückwunsch zu Ihrem heutigen Impftermin. Sie erhalten heute den Impfstoff **COMIRNATY von BioNTech/Pfizer**. Den **2. Impftermin** haben Sie aller Voraussicht nach in ca. **3-6 Wochen**.

Ca. **4 Wochen nach der 1. Teilimpfung** sind sie sehr wahrscheinlich vor einem schweren COVID-19 Verlauf geschützt.

Etwa **2 Wochen nach dem 2. Impftermin** ist - nach derzeitigem Stand der Wissenschaft – davon auszugehen, dass Sie sehr wahrscheinlich vor einer symptomatischen COVID-19 Infektion geschützt sind.

Sie können sich nach der **1. und nach der 2. Teilimpfung** immer noch **anstecken und das Virus weiterverbreiten**, also halten Sie bitte weiterhin die empfohlenen COVID-19-Maßnahmen ein.

3-6 Wochen + 2 Wochen = **5-8 Wochen**



**Impfreaktionen sind normal, Nebenwirkungen meldepflichtig!**

**Impfreaktionen:**

Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Muskel- und Gliederschmerzen, Fieber, Rötung und Schwellung an der Einstichstelle.

Impfreaktionen sind bei der **2. Impfung** stärker als nach der 1. Impfung ausgeprägt. Je höher das Lebensalter, desto weniger häufig und stark treten Impfreaktionen auf.

Bei Bedarf können Sie Mexalen (= Wirkstoff Paracetamol) einnehmen, sofern Ihre Leber gut funktioniert. Bitte nehmen Sie Paracetamol frühestens 6 Stunden nach der Impfung und nur bei Symptomen ein, um den Impfschutz nicht zu gefährden.

**Nebenwirkungen:**

Sollten Sie den Verdacht haben, dass eine Nebenwirkung aufgetreten ist oder Reaktionen länger als 3 Tage andauern, nehmen Sie Kontakt zu Ihren behandelnden (Haus-)ÄrztInnen auf. Zzgl. können Sie potentielle Nebenwirkung selbst auf [nebenwirkung.basg.gv.at](https://nebenwirkung.basg.gv.at) melden.

**Nur für PatientInnen mit Blutverdünnung:**

Bitte pressen Sie nach der Injektion für min. 3 Minuten fest auf die Einstichstelle, um eine Einblutung in den Muskel zu vermeiden.